ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

MIRRA PROPHYLACTIC
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА (БАД) К ПИЩЕ

МИРРА-АНГИО
Биокомплекс с дигидрокверцетином и витамином С

Фома выпуска: 50 таблеток массой 0,5 г | арт. 3258



- Способствует коррекции нарушений мозгового кровообращения.
- Обеспечивает защиту стенок сосудов и сердца.
- Помогает снизить риски развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, гипертонической болезни и инсультов.
- Замедляет снижение умственных способностей на ранних стадиях болезни Альцгеймера.

Состав:

- L-аскорбиновая кислота (витамин С)
- Экстракт Гинкго Билоба *Ginkgo biloba L*.
- Экстракт виноградных косточек *Vitis vinifera L*.
- Экстракт вербены *Verbena officinalis, L*.
- Дигидрокверцетин
- Вспомогательные компоненты

Биологически активные вещества	Содержание в 1 таблетке (суточная дозировка)	%
Витамин С, мг	35	58,3**
Дигидрокверцетин, мг	10,5	42*
Проантоцианидины, мг	25,2	25,2*
Флавонолгликозиды, мг	4,3	14,3*

Применение: взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема – 25 дней. При необходимости прием можно повторить.

Особенности приема: Допускается прием до 2 таблеток 2 раза в день.
В этом случае будет обеспечена следующая потребность организма в БАВ:
Витамин С — 140 мг (233,2% [1]),
Дигидрокверцетин — 42 мг (168% [1]),
Проантоцианидины — 100,8 мг (100,8% [1]),
Флавонолгликозиды — 17,2 мг (57,2%).

При постоянной работе в условиях интенсивных нагрузок на сердечно-сосудистую систему курсы приема БАД МИРРА-АНГИО в профилактических целях следует проводить 2-4 раза в год.

*% от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС (Приложение 5).
**% от рекомендованной суточной потребности согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложение 2).
1 – Не превышает верхний допустимый уровень потребления

Доказано, что основным фактором риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы является несбалансированное питание. Поэтому приём БАД для восполнения недостающих организму ингредиентов можно рассматривать как дополнительный способ профилактики сердечно-сосудистой патологии. Результаты многочисленных научных исследований показали, что длительный приём антиоксидантов снижает риск развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, гипертонической болезни и инсульта.
В рецептуре БАД МИРРА-АНГИО использован специально подобранный комплекс биофлавоноидов (из растений Гинкго Билоба, винограда, вербены и лиственницы) и витамин С.

Действие активных компонентов:
Витамин С является наиболее распространенным природным антиоксидантом, который при регулярном применении способствует снижению уровня холестерина, активирует липопротеид-липазы, тем самым снижая уровень триглицеридов в плазме. Он обеспечивает прочность сосудов, особенно в сочетании с биофлавоноидами. Витамин С оказывает антикоагуляционное действие и восстанавливает окисленные формы витаминов Е и А, активируя их как антиоксиданты.
Биофлавоноиды благотворно действуют на сердечно-сосудистую систему. Они способствуют снижению уровня липопротеидов низкой плотности, обладают способностью расширять коро-нарные сосуды, а также - гипотензивным и антитромботическим действием. При регулярном применении способствуют снижению уровня холестерина, активируют липопротеидлипазы, тем самым снижая уровень триглицеридов в плазме.
В БАД используются следующие биофлавоноиды:
Гинкго двулопастный, гинкго - реликтовое растение, часто называемое живым ископаемым, которое оказывает комплексное действие на сердечно-сосудистую систему за счет содержания в своем составе уникальных веществ гинкголидов. Гинкголиды, являясь естественными антагонистами фактора агрегации тромбоцитов, препятствуют тромбообразованию. Известно, что препараты Гинкго оказывают выраженное сосудорасширяющее и мембраностабилизирующее действие на клетки сердца и обладают антиаритмическими свойствами. Имея антиоксидантную активность, Гинкго нейтрализует действие свободных радикалов, препятствует окислению липопротеидов низкой плотности и развитию атеросклероза сосудов, способствует стабилизации клеточных мембран нейронов головного мозга и значительно улучшает микроциркуляцию в тканях головного мозга. Восстанавливая структуру сосудистой стенки, препараты Гинкго уменьшают ее проницаемость и предотвращают риск геморрагического инсульта. А за счет блокирования ферментов головного мозга Гинкго оказывает антидепрессивное и анксиолитическое действие. Поэтому он улучшает

память и ясность мыслей, повышает настроение, замедляет снижение умственных способностей на ранних стадиях болезни Альцгеймера. В БАД МИРРА-АНГИО используется экстракт Гинкго, стандартизованный по содержанию флавонолгликозидов.
Экстракт виноградных косточек содержит значительное количество проантоцианов, что обеспечивает его способность укреплять капилляры и позволяет использовать при различных расстройствах кровообращения, включая нарушения мозгового кровообращения. А содержание в них незаменимых аминокислот (например, лизина) способствует улучшению обмена веществ. Отмечено, что приём экстракта целесообразен при атеросклерозе, начальных стадиях гипертонической болезни.
Лечение сосудистой системы с помощью проантоцианидинов считается одним из наиболее эффективных способов, так как природные антиоксиданты хорошо усваиваются организмом и связывают свободные радикалы. То есть, такое лечение сосудов обеспечит нормальную проницаемость капилляров, снизив их хрупкость и повысив эластичность.
В БАД МИРРА-АНГИО используется экстракт косточек, стандартизованный по содержанию проантоцианидинов.
Вербена содержит гликозиды (вербелин, вербенамин), каротин, дубильные вещества, эфирное масло и горечь. Благодаря одному из гликозидов - вербенамину - препараты вербены лекарственной укрепляют и очищают стенки артерий и вен, восстанавливают поврежденные капилляры, снижают уровень холестерина и уменьшают вязкость крови, повышают эластичность сосудов, улучшают микроциркуляцию, нормализуют обменные процессы на клеточном уровне. Повышают иммунитет и оказывают общеукрепляющее действие, усиливают результативность комплексной терапии.
Дигидрокверцетин (диквертин) – биофлавоноидный препарат растительного происхождения, получаемый из древесины лиственницы сибирской или лиственницы даурской. Оказывает ангиопротекторное, антиоксидантное, дезитоксикационное, гепатопротекторное (антитоксическое), радиопротекторное и противоотечное действие; стимулирует процессы регенерации слизистой оболочки желудка. Препятствует пероксидному окислению липидов клеточных мембран, предохраняет стенки сосудов от повреждения, уменьшает отечность при воспалении, обладает гиполипидемической и диуретической активностью.

Биодобавку МИРРА-АНГИО принимают во время еды, курсами, как отдельно, так и в комплексе с другими БАД.
Ниже приведены схемы приема средства в профилактических целях - для предупреждения нарушений, связанных с нехваткой в организме необходимых для нормальной сердечно-сосудистой деятельности веществ - витамина С, дигидрокверцетина, проантоцианидинов и флавонолгликозидов.

Профилактика нарушений сердечно-сосудистой системы

Курс	БАД	Кол-во капсул/ таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительность курса, дни
1	МИРРА-АНГИО	1	1	25
Перерыв 3 дня				
2	МИРРА-АНГИО	1	1	25

При склонности кожи к появлению “сеточек” и “звездочек”, а также при куперозе

Курс	БАД	Кол-во капсул/ таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительность курса, дни
1	МИРРА-АНГИО	1	2	30
	МИРРАСИЛ-2	5	2	
	ПЕПТИДЫ РЫБНОГО КОЛЛАГЕНА	5 г	2	

При варикозном расширении вен

Курс	БАД	Кол-во капсул/ таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительность курса, дни
1	МИРРА-АНГИО	2	2	15
	МИРРАСИЛ-2	3(4)	2	
	МИРРА-КАЛЬЦИЙ	4	2	
Перерыв 3 дня				
2	МИРРА-АНГИО	2	2	15
	МИРРА-ОМЕГА 3	4	2	
	МИРРА-СЕЛЕН	2	2	
Перерыв 3 дня				
3	МИРРА-АНГИО	2	2	15
	МИРРА-ДИОВИТ	2	2	
	МИРРА-ФЕРРУМ	2	2	

При повышенном артериальном давлении

Курс	БАД	Кол-во капсул/ таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительность курса, дни
1	МЕДЕЛЛА-2	2	2	15
	МИРРА-АНГИО	2	2	
	МИРАНДА-2	2	2	
Перерыв 3 дня				
2	МЕДЕЛЛА-2	2	2	15
	МИРРА-АНГИО	2	2	
	МИРРАСИЛ-3	3(4)	2	
Перерыв 3 дня				
3	МЕДЕЛЛА-2	2	2	15
	МИРРА-КАЛЬЦИЙ	4	2	
	МИРРА-ЙОД	2	2	

Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов, беременность, кормление грудью.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ